

멀티미네랄 5주

인체의 면역력과 저항력을 증진시키는 필수 무기질 원소를 공급
수술 및 시술 시 빠른 쾌유를 위한 회복 주사



Multimineral 5 Inj.

Se 200 μ g, Zn 10mg, Cu 4mg, Mn 1mg, Cr 40 μ g/10ml

멀티미네랄 5주Multimineral5 Inj.

분류번호 : 339
기타의 혈액 및 체액용약

전문/일반	전문의약품		허가일	2020년 11월 19일	
KD코드	629702241		보험약가	비급여	
ATC코드	B05XA31 (electrolytes in combination with other drugs)				
성 상	무취의 무색 또는 미청색의 투명한 액이 무색투명한 바이알에 든 주사제				
원료약품 및 그 분량	1mL 중 Chromic chloride hydrate(Cr) (USP) 20.5μg (4μg as Cr) Manganese sulfate hydrate(Mn) (USP) 0.308mg (0.1mg as Mn) Zinc sulfate hydrate(Zn) (BP) 4.39mg (1mg as Zn) Cupric sulfate hydrate(Cu) (USP) 1.57mg (0.4mg as Cu) Selenious acid(Se) (USP) 32.7μg (20μg as Se)				
효능 · 효과	경정맥 영양보급 시 미량원소(아연, 구리, 망간, 셀레늄, 크롬)의 보급				
용법 · 용량	의사의 처방에 따라 사용하되, 혈장 미량 원소량을 확인하여 용량 조절의 지침으로삼는다.				
	-허용용량범위(정맥주사용)				
	구분	대사적으로 안정한 비경구영양수액 투여환자		소아환자	
	아연	1일 2.5~4mg		5세이하 : 1일 체중 kg당 100μg	
	구리	1일 0.5~1.5mg		1일 체중 kg당 20μg	
	망간	1일 0.15~0.8mg		1일 체중 kg당 2~10μg	
	크롬	1일 10~15μg		1일 체중 kg당 0.14~0.20μg	
셀레늄	1일 20~40μg		1일 체중 kg당 3μg		
기타	아연 -대사적으로 안정한 소장액 손실 환자: 추가로 12.2mg/L(소장액 손실량) 또는 17.1mg/kg(배변량) -급성이화상태환자: 1일 4.5~6mg 크롬 -대사적으로 안정한 소장액 소실 환자 : 1일 20μg 셀레늄 -장기 비경구영양수액 투여로 인한 결핍 1일 100μg을 24~31일간 사용할 수 있다.				
사용상의 주의사항	첨부문서 참조				
저장방법	밀봉용기, 15 ~ 30℃ 보관	사용기간	제조일로부터 36개월	포장단위	10ml X 10V

