

베타손 연고 500g

- MRSA를 포함한 그람양성균 및 일부 음성균에 대한 우수한 항균 효과
- 국소 투여로 전신 흡수가 미미하여 전신 부작용 위험이 낮음
- 표재성 세균 감염을 포함한 다양한 피부 감염 치료에 효과적



무피로신 20mg

Bentasone Ointment

Mupirocin 20mg

벤타손연고 500g

Bentasone Oinment

분류번호 : 269
기타의 외피용약

제품명	벤타손연고 / Bentasone Ointment		전문/일반	일반의약품	
표준코드	8806980020036		보험약가	비급여	
성상	얇은 흰색의 연고		ATC코드	D06AX09 (mupirocin)	
주성분	이 약 1 g 중 무피로신 (KP) ----- 20.0 mg(역가)				
약효·약리	무피로신은 세균 단백질 합성을 억제하는 국소 항생제입니다.세균의 아이소류실-tRNA 합성효소(isoleucyl-tRNA synthetase)에 가역적으로 결합하여, 단백질 합성을 방해하고, 그 결과 세균의 성장을 억제하거나 사멸을 유도합니다.				
효능·효과	1. 유효균종: 메치실린 내성 균주를 포함한 황색포도상구균, 기타 포도상구균, 연쇄상구균과 같은 대부분의 피부감염증의 원인균, 대장균 및 인플루엔자균과 같은 그람음성균 2. 적응증: 1) 농가진 (고름딱지증), 모낭염, 종기증, 감염성 습진과 같은 세균성 피부감염증 2) 외상 (상처) 및 화상에서의 세균성 피부감염증				
용법·용량	감염 부위를 1일 2-3회 10일간 소량을 바른다. 필요한 경우 바른 부위를 드레싱 하거나 밀봉할 수 있다.				
사용상의 주의사항	1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 이 약 또는 이 약의 성분이나 폴리에틸렌글리콜을 함유하는 다른 연고제에 과민증 및 그 병력이 있는 환자 2) 신질환 환자 (폴리에틸렌글리콜이 찢긴 상처 및 손상된 피부를 통해 흡수될 수 있으며, 신장을 통해 배설된다.) 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 4) 수유부 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 노출되어 찢긴 상처 및 손상된 피부에 장기간 사용하지 않는다 (동물실험에서 면역 기능 저하에 관한 안전성 증거가 불충분하다). 3. 이상 반응 1) 무피로신 또는 연고 기제로 인하여 작열감 (화끈감), 자통 (찌르는 것 같은 아픔) 또는 동통 (통증), 가려움, 발진, 홍반 (붉은 반점)등의 피부 과민반응이 나타날 수 있다. 2) 때때로 구역, 피부 건조, 압통 (누르는 통증), 부종 (부기), 접촉성 피부염, 삼출물 증가가 나타날 수 있다. 3) 드물게 전신적인 알레르기 반응이 보고되었다. 4. 일반적 주의 1) 이 약으로 인한 과민증 또는 중증 (심한 증상)의 국소자극, 가려움, 발진 등이 나타날 경우에는 사용을 중지하고, 피부에서 연고를 깨끗이 씻어낸 후, 의사 또는 약사와 상의하여 감염 치료를 위한 다른 방법을 선택한다. 2) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소기간만 사용한다. 3) 다른 항생물질과 같이 이 약을 장기 연용 하는 경우에는 진균 등을 포함하여 미생물의 과다증식을 유발할 수 있다. 4) 3~5일간 사용 후 개선 효과가 나타나지 않으면, 의사 또는 약사와 상의하여 이 약의 사용을 다시 고려한다. 5) 이 약을 얼굴에 사용하는 경우에는 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 6) 운전이나 기계조작능력과 관련된 이상 반응은 확인된 바 없다. 5. 상호작용 이 약과 다른 여러 약물을 동시에 사용할 경우, 희석되어 항균작용이 감소되고 이 약의 안정성이 소실될 수 있다. 6. 임부 및 수유부에 대한 투여 1) 임부에서의 이 약의 사용과 관련된 적절한 자료가 없다. 동물실험에서 최기형성 (기형유발성)은 나타나지 않았으나, 동물실험 결과로 인체 내에서의 반응을 예측할 수는 없으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 이 약을 사용하지 않는다. 2) 수유 중인 사람과 동물에서의 이 약의 사용과 관련된 적절한 자료가 없다. 유즙으로의 이행 여부는 알려져 있지 않으므로 이 약의 투여 중에는 수유를 중단한다. 7. 과량투여 시의 처치 이 약의 독성은 매우 낮다. 과량 투여한 경우에는 해당 부위를 깨끗이 씻는 등 대증요법 (증상별로 치료하는 방법)을 실시한다. 8. 적용상의 주의 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 이 약은 눈, 코 등의 점막 표면에 사용하지 않는다. -비강 내 (코안)에 사용 시 자통 (찌르는 것 같은 아픔) 및 건조의 발생이 보고되었다. 3) 이 약은 중앙 정맥 삽관법을 시행할 부위에 사용하기에는 적합하지 않다. 9. 보관 및 취급상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 치료 후 남은 약은 폐기할 것 3) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것				
저장방법	기밀용기, 실온(1-30℃)보관	사용기간	제조일로부터 24 개월	포장단위	500 g/통