

건티온 주

1200mg

글루타티온(환원형)



Kuhnthione Inj.
Glutathione(reduced) 1200mg

건티온 Kuhnthione Inj. 주 1200mg

분류번호 : 399

따로 분류되지 않는 대사성 의약품

전문/일반	전문 의약품	보험약가	비급여
KD코드	073000801	ATC코드	V03AB32 (Glutathione)
성 상	무색 투명한 바이알에 흰색의 다공성 고체가 든 주사제		
주성분	1바이알 중 유효성분 : 글루타티온(환원형)(KP) ----- 1200 mg 첨가제(안정제) : 탄산수소나트륨(KP) ----- (적량)		
효능 · 효과	시스플라틴 또는 유사계열 화학요법에 의한 신경성질환의 예방		
용법 · 용량	중증의 경우 1일 600~1200mg을 근육 주사 또는 점적 정맥 주사합니다. 수일에 걸쳐 치료하는 경우 또는 경미한 경우에는 1일 300~600mg을 근육 주사 또는 점적 정맥 주사합니다.		
사용상의 주의사항	1.이상반응 1) 아나필락시양 증상 : 드물게 아나필락시양 증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 안면창백, 혈압저하, 맥박이상 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지합니다. 2) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지합니다. 3) 소화기계 : 드물게 식욕부진, 구역, 구토, 위통이 나타날 수 있습니다. 2.적용상의 주의 1) 조제시 : 바이알 제제는 용해 후 즉시 사용합니다. 2) 근육주사하는 경우에는 신경 및 혈관을 피하여 신중히 투여합니다. 또, 반복투여의 필요성이 있는 경우에는 좌우를 바꾸어 주사하는 등 동일부위를 피하고 유·소아에는 특히 주의합니다. 3.보관 및 취급상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.		
저장방법	밀봉용기, 1 ~ 30℃ 보관	포장단위	10mL X 10바이알