

엔디멜라 정

Endymela Tab.

Anti-Inflammatory Enzymes

Bromelain
Trypsin Crystalline



엔디멜라정 Endymela Tab.



분류번호 : 395

효소제제

전문/일반	일반의약품		보험약가	비급여	
ATC코드	M09AB52(trypsin, combinations)		KD코드	073200040	
성상	연녹색의 원형 장용성 필름코팅정		허가일	2021년 04월 26일	
원료약품 및 그 분량	이 약 1정(291mg) 중 브로멜라인(USP) 40mg(20,000 브로멜라인 단위) 결정트립신(KP) 1mg(2,500 USP 트립신 단위)				
약리작용	트립신 : 항염증제, 항부종제, 항산화제, 항감염제로서 활성을 가지고 있으며 조직손상으로 인해 발생한 과도한 염증반응을 억제하고 빠른 상처 회복에 도움 브로멜라인 : 1) 섬유소 용해 효소인 플라스민(Plasmin)을 증가시켜 섬유소 분해를 자극하여 염증성 부종을 완화하고 손상된 조직의 회복을 도움 2) 키닌(Kinin)생성을 억제하여 염증반응을 억제함				
특장점	1) 특정 염증반응 억제가 아닌 전신에 항염증 효과가 있어 특정 질환이 아닌 다양한 염증성 질환에 사용 가능 2) 성형 수술 후 붓기, 눈다래끼, 귀 뚫고 염증 완화, 관절염, 염좌 등 다양한 수술 후 붓기와 염증 억제에 적합				
효능·효과	다음 질환 및 증상의 염증성 부종(부기)의 완화 : 수술 및 외상(상처) 후, 유즙울체(젖고임)				
용법·용량	성인 : 첫날 1회 2정, 1일 4회, 이후 유지량으로 1회 1정, 1일 4회 복용한다. 체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과 관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.				
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 먹지 말 것. 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(Galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애 (Glucose- galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 1) 혈액 응고 이상 환자 2) 심한 간 장애 또는 신장애(신장(콩팥)장애) 환자 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (임신 중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.) 4) 항응고제를 투여하고 있는 환자(병용(함께 복용(사용))투여 때문에, 항응고제의 작용이 증강될 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.) 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한, 이 첨부 문서를 소지할 것. 1) 과민반응 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 2) 소화기계 : 설사, 변비, 때때로 식욕부진, 배가 거북함, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다. 3) 혈액계 : 드물게 코피, 혈액가래 등의 출혈 경향이 나타날 수 있다. 4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 : 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.				
저장방법	기밀용기, 실온(1~30℃)보관	사용기간	제조일로부터 36개월	포장단위	1,000정/병