

Ginkgo Biloba Leaf Dried Extract 17.5mg/5ml

깡코주

Ginkgo Inj.

- Science-Based Herbal Supplement
- Promotes Antioxidant Status, Brain Function, Circulation



깡코주

Ginkgo Biloba Leaf Dried Extract 17.5mg/5mL

분류번호 : 219

전문의약품

Drug Information

성 상	엷은 갈색의 액이 들어있는 갈색의 유리 앰플제		
성분 · 함량	이 약 1 앰플 (5mL)중 은행엽건조엑스(생규) 17.5mg/5mL (총 깡코플라본 배당체로서 4.2mg/5mL 해당)		
약리작용	1. 혈관 확장을 통한 뇌혈관과 말초혈관의 혈류개선 2. 혈소판 활성화인자의 활성을 억제 3. 항산화 효과를 통한 세포 손상 예방 4. 뇌 대사 활성화를 통한 뇌 기능 장애 개선		
특 · 장점	1. 뇌기능 장애와 말초혈관 순환 장애에 광범위하게 사용 2. 유럽에서 오랜 사용 경험으로 입증된 효능 3. 우수한 내약성 및 안전성 4. 노인이나 만성질환자의 장기 치료에 적합		
효능 · 효과	1) 뇌혈액순환장애 및 뇌영양장애(뇌혈관부전), 다음 증상을 수반하는 뇌기능장애 : 지적 및 경각능력저하, 어지러움, 이명, 두통, 시력장애, 기억력감퇴, 불안, 우울감, 내이성난청, 혈관성 · 대사성 경부증상으로 인한 청각 및 언어능력 저하 2) 동맥경화성 혈관증, 괴저 상태의 당뇨병성 혈관손상, PAOD-(말초동맥폐색질환 또는 간혈성파행증) 폐색성 혈관내막염, 레이노드병과 기타 호르몬성 및 신경성 혈관장애, 혈관증, 혈관증으로 인한 영양장애 등과 같은 말초동맥순환장애		
용법 · 용량	- 1일 5 ~ 10mL를 근육주사 또는 정맥주사하거나 2일마다 15mL를 정맥 주사한다. - 급성치료시: 1일 25mL를 정맥주사 또는 점적정주한다 - 중증치료시: 1일 25-50mL를 정맥주사 또는 점적정주 한다		
저장방법	밀봉용기, 실온(1~30°C)보관	사용기간	제조일로부터 36 개월
포장단위	5mL × 25앰플	보험약가	비급여
사용 상의 주의사항	1. 경고 앰플 주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것. 2. 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 이 약에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자 2) 임부 또는 임신하고 있는 가능성이 있는 여성 3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제, 항혈소판제)을 복용하고 있는 환자 2) 수술이 예정된 자 4. 이상반응 1) 드물게 가벼운 위장장애, 특히 알러지가 있는 환자에게는 순환기장애 증상(저혈압, 현기증, 두통, 열감, 개인에 따라 심박동장애), 불면, 알러지성 피부증상이 일어날 수 있다. 2) 개인에 따라 부분적으로 다소 빈번하게, 말단부위의 통증, 위장장애, 발열, 오한, 속 등이 관찰된다. 3) 피로, 만성기도폐색, 하지부종, 협심증 유사증상이 나타날 수 있다. 4) 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 5. 수유부 모유 수유 중에는 복용을 피하는 것이 좋다. 은행엽엑스 성분이 모유로 이행되는지 여부는 알려져 있지 않다. 6. 기타: 이 약은 당 대사에 영향을 주지 않는다는 보고가 있다.		



서울시 강서구 강서로 499, 대하빌딩 3F, <http://biowellpharm.co.kr>

TEL | 02-3663-2257 FAX | 02-3663-2254

- 물류창고 : 서울특별시 강서구 강서로 499, B1 (가양동, 대하빌딩)
- 부산사무소 : 부산광역시 남구 수영로 312 센츨리티빌딩 906호
- 광주사무소 : 광주광역시 동구 수기동 23-2 제일오피스텔 1311호
- 대구사무소 : 대구광역시 중구 태평로160 7층 202호
- 경기사무소 : 경기도 용인시 수지구 현암로 108, 3층 13호